

# **PFIZER EDUCATION**

---



Today you are receiving the **first dose** in the Pfizer two-dose series:

- Pfizer is an intermuscular immunization administered in the deltoid muscle.
- If you are under 18 years old, it is recommended that your parent/guardian attend the clinic with you.
- Since you are receiving Pfizer for your first dose, you must receive Pfizer for your second dose.
- Geauga Public Health will arrange for your second dose in approximately 21 days.
- The nurse will give you a return date for the second dose, the location and time are the same as the first dose appointment.
- You will not receive full vaccine protection until 2 weeks after your second dose.
- Once you are immunized, continue to wear a mask, social distance, and perform hand hygiene.
- Take Tylenol or Ibuprofen for comfort from any potential side effects.

## **Potential Side Effects**

- Sore arm at injection site
- Headache
- Low grade fever
- Chills
- Muscle Aches

## **CLINIC PROCESS**

1. You will be called to get immunized in the order of your arrival.
2. Make sure your arm is free of clothing/jackets.
3. Give your completed and signed consent form to the nurse at the tent. If you are under 18 years old, your parent/guardian must write their name and sign the form where it is indicated on the form.
4. The immunizer will complete the bottom portion of the form.
5. The immunizer may ask you some questions based on the information on your form.
6. The immunizer will give you your immunization card with your first dose Vial Lot # and today's date.
7. Based on your health history; the immunizer will instruct you on how long you will remain in recovery (15-30 minutes).
8. If you have any questions, ask your nurse prior to being immunized.
9. Make sure to keep the immunization card for your personal record. Please bring your immunization card with you to be updated with your second dose.

**If at any time during the recovery period, if you do not feel well PLEASE tell someone sitting next to you.**



Hoy está recibiendo la **primera dosis** de la serie de dos dosis de Pfizer:

- ModPfizer es una inmunización intramuscular que se administra en el músculo deltoides.
- Si es menor de 18 años, se recomienda que su padre / tutor asista a la clínica con usted.
- Dado que está recibiendo Pfizer para su primera dosis, debe recibir Pfizer para su segunda dosis.
- Geauga Public Health organizará su segunda dosis en aproximadamente 21 días.
- La enfermera le dará una fecha de regreso para la segunda dosis, el lugar y la hora son los mismos que en la cita de la primera dosis.
- No recibirá la protección total de la vacuna hasta 2 semanas después de su segunda dosis.
- Una vez que esté inmunizado, continúe usando una máscara, distancia social y realice la higiene de manos.
- Tome Tylenol o Ibuprofeno para aliviar los posibles efectos secundarios.

## **Efectos Secundarios Potenciales**

- Dolor en el brazo en el lugar de la inyección
- Dolor de cabeza
- Fiebre leve
- Escalofríos
- Dolores musculares

## **Proceso Clínico**

1. Se le llamará para vacunarse en el orden de llegada.
2. Asegúrese de que su brazo esté libre de ropa / chaquetas.
3. Entregue su formulario de consentimiento completado y firmado a la enfermera en la tienda. Si es menor de 18 años, su padre / tutor debe escribir su nombre y firmar el formulario donde se indica en el formulario.
4. El inmunizador completará la parte inferior del formulario.
5. El inmunizador puede hacerle algunas preguntas basándose en la información de su formulario.
6. El inmunizador le dará su tarjeta de vacunación con el número de lote del vial de la primera dosis y la fecha de hoy.
7. Basado en su historial médico; el inmunizador le indicará cuánto tiempo permanecerá en recuperación (15-30 minutos).
8. Si tiene alguna pregunta, consulte a su enfermero antes de vacunarse.
9. Asegúrese de guardar la tarjeta de vacunación para su registro personal. Traiga su tarjeta de vacunación para que la actualice con su segunda dosis.

**Si en algún momento durante el período de recuperación no se siente bien, POR FAVOR, dígaselo a alguien sentado a su lado.**

# PFIZER EDUCATION

---



Today you are receiving the **second dose** in the Pfizer two-dose series:

- Pfizer is an intermuscular immunization administered in the deltoid muscle.
- If you are under 18 years old, it is recommended that your parent/guardian attend the clinic with you.
- Since you are receiving the second dose in the Pfizer series, that means that you should have received Pfizer as your first dose as well.
- You will not receive full vaccine protection until 2 weeks after your second dose.
- Once you are immunized, continue to wear a mask, social distance, and perform hand hygiene.
- Take Tylenol or Ibuprofen for comfort from any potential side effects.

## **Potential Side Effects**

- Sore arm at injection site
- Headache
- Low grade fever
- Chills
- Muscle Aches

## **CLINIC PROCESS**

1. You will be called to get immunized in the order of your arrival.
2. Make sure your arm is free of clothing/jackets.
3. Give your completed and signed consent form to the nurse at the tent. If you are under 18 years old, your parent/guardian must write their name and sign the form where it is indicated on the form.
4. The immunizer will complete the bottom portion of the form.
5. The immunizer may ask you some questions based on the information on your form.
6. The immunizer will update your immunization card with your second dose Vial Lot # and today's date.
7. Based on your health history; the immunizer will instruct you on how long you will remain in recovery (15-30 minutes).
8. If you have any questions, ask your nurse prior to being immunized.
9. Make sure to keep the immunization card for your personal record.

**If at any time during the recovery period, if you do not feel well PLEASE tell someone sitting next to you.**



Hoy está recibiendo **la segunda dosis** de la serie Pfizer de dos dosis:

- Pfizer es una inmunización intermuscular que se administra en el músculo deltoides.
- Si es menor de 18 años, se recomienda que su padre / tutor asista a la clínica con usted.
- Dado que está recibiendo la segunda dosis de la serie Pfizer, eso significa que también debería haber recibido Pfizer como su primera dosis.
- No recibirá la protección total de la vacuna hasta 2 semanas después de su segunda dosis.
- Una vez que esté inmunizado, continúe usando una máscara, distancia social y realice la higiene de manos.
- Tome Tylenol o Ibuprofeno para aliviar los posibles efectos secundarios.

## **Efectos Secundarios Potenciales**

- Dolor en el brazo en el lugar de la inyección
- Dolor de cabeza
- Fiebre leve
- Escalofríos
- Dolores musculares

## **Proceso Clínico**

1. Se le llamará para vacunarse en el orden de llegada.
2. Asegúrese de que su brazo esté libre de ropa / chaquetas.
3. Entregue su formulario de consentimiento completado y firmado a la enfermera en la tienda. Si es menor de 18 años, su padre / tutor debe escribir su nombre y firmar el formulario donde se indica en el formulario.
4. El inmunizador completará la parte inferior del formulario.
5. El inmunizador puede hacerle algunas preguntas basándose en la información de su formulario.
6. El inmunizador actualizará su tarjeta de vacunación con el número de lote del vial de la segunda dosis y la fecha de hoy.
7. Basado en su historial médico; el inmunizador le indicará cuánto tiempo permanecerá en recuperación (15-30 minutos).
8. Si tiene alguna pregunta, consulte a su enfermero antes de vacunarse.
9. Asegúrese de guardar la tarjeta de vacunación para su registro personal.

**Si en algún momento durante el período de recuperación no se siente bien, POR FAVOR, dígaselo a alguien sentado a su lado.**